

Skema til brug for det overordnede skøn over behandlingsudgifter i arbejdsskadesager

Skemaet er opbygget efter mén-tabellens punkter, hvilket skulle gøre det nemmere og mere overskueligt at slå op i.

Det er formålet med skemaet, at sagsbehandlingen skal lattes og sagsbehandlingstiden gøres hurtigere. Sagsbehandleren vil ved at anvende skemaet finde svar på spørgsmål, der tidligere ofte blev besvaret af lægekonsulenterne. Det gælder bl.a. spørgsmålet om, hvor længe en given behandling har helbredende karakter og derved kan dækkes.

Skemaet omhandler både behandlingsudgifter under sagens behandling samt fremtidige behandlingsudgifter.

Skemaet er vejledende og bør alene opfattes som generelle retningslinier med plads til det konkrete skøn.

Nedenstående opbygning svarer til mén-tabellens	Bemærkninger	Behandlingsform	Behandlingsvarighed	Dækning af udgifter under sagens behandling	Dækning af udgifter i en fremtidig afgrænset periode	Dækning af fremtidig permanente udgifter (varig effekt)
A. Hoved						
A.1 Tænder og kæbe	Se specielt afsnit om tandskader					
A.2. Næse		Medicin: Smertestillende	0 – 3 måneder	ja	ja	Nej
A.4. Hjernen						
A.4.1. Postkommotionelt syndrom (følger efter hjernerystelse)						

A.4.1.1. Lette symptomer		Medicin: Smertestillende + Fysioterapi/ Kiropraktor	Fysioterapi/ Kiropraktor: 0-3 måneder	Ja	Ja	Medicin: Smertestillende
A.4.1.2. Middelsvære symptomer		Medicin: Smertestillende + Fysioterapi/ Kiropraktor	Fysioterapi/ Kiropraktor: 0-6 måneder	Ja	Ja	Medicin: Smertestillende
A.4.1.3. Svære symptomer		Medicin: Smertestillende + Fysioterapi/ Kiropraktor Neuropsykolog/ Psykolog	Fysioterapi/ Kiropraktor: 0-9 Måneder	Ja	Ja	Medicin: Smertestillende
A.4.2. Demens		Neuropsykolog/ Psykolog+Evt. Hjerneska- Center +	Svarende til behandlings- forløbet	Ja	Ja	Medicin: remynyl
A.4.3. Fokale hjernesker						
A.4.3.1. Afasi		Sprogtræning (vederlagsfrit)	Svarende til behandlings- forløbet.	Ja	Ja	
A.4.3.2. Frontalt syndrom		Neuro-Psykolog/ Psykolog+Evt. Hjerneska- Center		Neuropsyk olog/ Psykolog		Medicin: remynyl
A.4.4. Motoriske symptomer efter hjernesker		Medicin: Spasmeløsende		Ja	Ja	Udskiftning af bandager+

		+ Fysioterapi: (vederlagsfrit)+ Skinner, Bandager (kan også i nogle tilfælde være hjælpemiddel)				Skinner ca. 1 gang pr. år
A.4.4.2. Ataksi og koordinationsforstyrrelse uden lammelse		Medicin: Spasmeløsende + Fysioterapi: (vederlagsfrit)		Ja	Ja	Medicin: Spasmeløsende)
A.4.5. Posttraumatisk epilepsi						
A.4.5.1. Enkeltstående anfald uden behandling		Medicin		Ja	Ja	
A.4.5.2. Behandlingskrævende epilepsi, men velbehandlet med ingen eller sjældne anfald		Medicin		Ja	Ja	Medicin
A.4.5.3. Behandlingskrævende epilepsi, men trods behandling svære hyppige anfald		Medicin		Ja	Ja	Medicin
A.4.6. Dysartri		Taletræning (vederlagsfrit)	Svarende til behandlings- forløb	Ja	Ja	
A.5. Øje og syn	Se specielt afsnit om øjne					
A.6. Øre/hørelse	Se specielt afsnit om øre/hørelse					
A.7. Lugtesans	Ingen behandling					

A.7.2 Kronisk allergisk betændelsestilstand		Næsespray med steroid og antihistamin tabletter		Ja	Ja	Ja
A.8. Lammelse af facialisnerver (ansigtsnerver)		Fysioterapi+ (ergoterapi-hospital)		Fysioterapi	Fysioterapi	
B. Hvirvelsøjle og bækken						
B.1. Hvirvelsøjlen						
B.1.1. Nakken	Se specielt afsnit om hvirvelsøjlen					
B.1.2. Brystryggen	Se specielt afsnit om hvirvelsøjlen					
B.1.3. Lænderyggen	Se specielt afsnit om hvirvelsøjlen					
B.1.4. Isoleret nerveudfald (rodpåvirkning)	Spørg lægekonsulenten i hvert tilfælde					
B.2. Bækkenbrud						
B.2.1. Lette, men ikke daglige smerter og uden asymmetri		Fysioterapi	Fysioterapi: 0-3 måneder Indenfor 1. år	Ja	Ja	Nej
B.2.2. Lette, daglige smerter og uden asymmetri		Fysioterapi	Fysioterapi: 0-3 måneder indenfor 1. år	Ja	Ja	Nej
B.2.3. Middelsvære, daglige smerter		Fysioterapi	Fysioterapi:	Ja	Ja	Nej

og uden asymmetri			0-3 måneder indenfor 1. år			
B.2.4. Svære, daglige smerter og uden asymmetri		Fysioterapi	Fysioterapi: 0-3 måneder indenfor 1. år	Ja	Ja	Nej
B.2.5. Lette, daglige smerter og asymmetri		Fysioterapi	Fysioterapi: 0-3 måneder indenfor 1. år	Ja	Ja	Nej
B.2.6. Middelsvære, daglige smerter og asymmetri		Fysioterapi	Fysioterapi: 0-6 måneder indenfor 1. år	Ja	Ja	Nej
B.2.7. Svære, daglige smerter og asymmetri		Fysioterapi	Fysioterapi: 0-12 måneder indenfor 1. år	Ja	Ja	Ja
B.3. Haleben		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor 1. år	Ja	Ja	Nej
B.4. Rygsmarvslæsion	Spørg lægekonsulenten i hvert tilfælde					
C.1. Ribben		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder fra skaden	Ja	Ja	Nej
D.1.1. Fingre		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.1. Tab af alle fingre på en hånd		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.2. Tab af tommelfinger med		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder	Ja	Ja	Nej

mellemhåndsben			indenfor ½ år			
D.1.1.1.3. Tab af tommelfinger		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.4. Tab af tommelfingers yderstykke		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.5. Tab af tommelfingers halve yderstykke		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.6. Tommelfinger med stift yderled i god stilling		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.7. Tommelfinger med stift grundled i god stilling		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.8. Tommelfinger med stift yder- og grundled i god stilling		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.9. Beskadigelse af sideledbånd i tommelfingerens grundled med generende løshed		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.10. Brud, der omfatter tommelfingerens rodled, med daglige, belastningsudløste smerter		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.11. Tommelfinger med stift rodled i god stilling		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.12. Tab af 2. finger		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.13.		Medicin:	Medicin:	Ja	Ja	Nej

Tab af 2. fingers yder- og midterstykke		Smertestillende	0-3 måneder indenfor ½ år			
D.1.1.1.14. Tab af 2. fingers yderstykke		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.15. 2. finger med stift grundled i strakt stilling		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.16. 2. finger med 90 grader strækkemangel i midterled		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.17. Tab af 3. finger		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.18. Tab af 3. fingers yder- og midterstykke		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.19. Tab af 3. fingers yderstykke		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.20. 3. finger med stift grundled i strakt stilling		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.21. 3. finger med 90 grader strækkemangel i midterled		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.22. Tab af 4. finger		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.23. Tab af 4. fingers yder- og midterstykke		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej

D.1.1.1.24. Tab af 4. fingers yderstykke		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.25. 4. finger med stift grundled i strakt stilling		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.26. 4. finger med 90 grader strækkemangel i midterled		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.27. Tab af 5. finger		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.28. Tab af 5. fingers yder- og midterstykke		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.29. Tab af 5. fingers yderstykke		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.30. Tab af 1. og 2. finger		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.31. Tab af 1. og 2. fingers yderstykke		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.32. Tab af 1., 2. og 3. finger		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.33. Tab af 1., 2. og 3. fingers yderstykke		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.34. Tab af 1., 2., 3. og 4. finger		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder	Ja	Ja	Nej

			indenfor ½ år			
D.1.1.1.35. Tab af 2. og 3. finger		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.36. Tab af 2. og 3. fingers yder- og midterstykke		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.37. Tab af 2. og 3. fingers yderstykke		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.38. Tab af 2., 3. og 4. finger		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.39. Tab af 2., 3. og 4. fingers yder- og midterstykke		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.40. Tab af 2., 3. og 4. fingers yderstykke		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.41. Tab af 2., 3., 4. og 5. finger		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.42. Tab af 2., 3., 4. og 5. fingers yder- og midterstykke		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.43. Tab af 2., 3., 4. og 5. fingers yderstykke		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.44. Tab af 3., 4. og 5. finger		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.45. Tab af 3., 4. og 5. fingers yder- og		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder	Ja	Ja	Nej

midterstykke			indenfor ½ år			
D.1.1.1.46. Tab af 3., 4. og 5. fingers yderstykke		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.47. Tab af 4. og 5. finger		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.48. Tab af 4. og 5. fingers yder- og midterstykke		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.49. Tab af 3. og 4. fingers eller 4. og 5. fingers yderstykke		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.1.50. 3. og 4. finger med 90 grader strækkemangel i midterled		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder indenfor ½ år	Ja	Ja	Nej
D.1.1.2. Hvide fingre – morbus Raynaud		Intet				
D.1.2. Hånd og håndled						
D.1.2.1. Tab af hånd	Spørg lægekonsulenten i hvert tilfælde					
D.1.2.2. Håndledsbrud helet med lette smerter og let nedsat bevægelighed		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi.	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-6 måneder	Ja	Ja	Medicin: Smertestillende ved kroniske smerter
D.1.2.3. Håndledsbrud helet med middelsvære smerter og middelsvært nedsat bevægelighed samt eventuel forskydning og skurren		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi.	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-6 måneder	Ja	Ja	Medicin: Smertestillende ved kroniske smerter

D.1.2.4. Håndledsbrud helet med svære smerter og svært nedsat bevægelighed, samt eventuel forskydning og skurren		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-6 måneder	Ja	Ja	Medicin: Smertestillende ved kroniske smerter
D.1.2.5. Stivhed af håndled i god arbejdsstilling		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-6 måneder	Ja	Ja	Medicin: Smertestillende ved kroniske smerter
D.1.2.6. Følger efter brud og/eller bløddelslæsioner på hånd/underarm, hvor de fire ulnare fingres blommer ved knytning af hånden har en afstand på 2 cm fra hulhånd		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-6 måneder, Fysioterapi: 0-6 måneder	Ja	Ja	Medicin: ved kroniske smerter
D.1.2.7. Følger efter brud og/eller bløddelslæsioner på hånd/underarm, hvor de fire ulnare fingres blommer ved knytning af hånden har en afstand på 5 cm fra hulhånd		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-6 måneder, Fysioterapi: 0-6 måneder	Ja	Ja	Medicin: ved kroniske smerter
D.1.3. Underarm						
D.1.3.1. Seneskedehindebetændelse - til tider belastningsudløste smerter og normal bevægelighed		Medicin, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Nej
D.1.3.2. Seneskedehindebetændelse med daglige, belastningsudløste smerter og normal bevægelighed		Medicin, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Medicin: Varigt
D.1.3.3. Seneskedehindebetændelse med daglige smerter og let bevægeindskrænkning		Medicin, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Medicin: Varigt

D.1.4. Albue						
D.1.4.1. Til tider belastningsudløste smerter og normal bevægelighed		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi.	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Nej
D.1.4.2. Daglige, belastningsudløste smerter og let nedsat bevægelighed		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Nej
D.1.4.3. Daglige, belastningsudløste smerter og middelsvært nedsat bevægelighed ved bøjning og/eller drejning		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Nej
D.1.4.4. Daglige, belastningsudløste smerter og svært nedsat bevægelighed til bøjning 90 grader		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-6 måneder, Fysioterapi: 0-6 måneder	Ja	Ja	Medicin: Smertestillende ved kroniske smerter
D.1.4.5. Ophævet drejebevægelighed af underarm med hånden i højkantstilling		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi.	Medicin: 0-6 måneder, Fysioterapi: 0-6 måneder.	Ja	Ja	Medicin: Smertestillende ved kroniske smerter
D.1.4.6. Stivhed i albueled med 90 graders bøjning		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi.	Medicin: 0-6 måneder, Fysioterapi: 0-6 måneder	Ja	Ja	Medicin: Smertestillende ved kroniske smerter
D.1.4.7. Velfungerende kunstigt albueled		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi.	Medicin: 0-6 måneder, Fysioterapi: 0-6 måneder	Ja	Ja	Medicin: Smertestillende ved kroniske smerter
D.1.4.8. Ikke velfungerende kunstigt albueled		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi.	Medicin: 0-6 måneder, Fysioterapi: 0-6 måneder	Ja	Ja	Medicin: Smertestillende ved kroniske smerter
D.1.4.9. Tennisalbue - til tider		Medicin:	Medicin:	Ja	Ja	Nej

belastningsudløste smerter og normal bevægelighed		Smertestillende, Fysioterapi.	0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder			
D.1.4.10. Tennisalbue med daglige, belastningsudløste smerter og normal bevægelighed		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi.	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Medicin: Smertestillende - varigt
D.1.4.11. Tennisalbue med daglige, belastningsudløste smerter og let nedsat bevægelighed		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi.	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Medicin: Smertestillende - varigt
D.1.5. Skulder						
D.1.5.1. Til tider belastningsudløste smerter og normal bevægelighed		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi.	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Nej
D.1.5.2. Daglige, belastningsudløste smerter og let nedsat bevægelighed		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi.	Medicin: 0-3 måneder. Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Nej
D.1.5.3. Daglige, belastningsudløste smerter og middelsvært nedsat bevægelighed til aktivt frem-op og ud-op 90 grader		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi.	Medicin: 0-6 måneder, Fysioterapi: 0-6 måneder	Ja	Ja	Nej
D.1.5.4. Daglige, belastningsudløste smerter og svært nedsat bevægelighed til aktivt frem-op og ud-op 45 grader		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi.	Medicin: 0-12 måneder, Fysioterapi: 0-12 måneder	Ja	Ja	Nej
D.1.5.5. Tilbagevendende ledskred i skulderleddet		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi.	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Fysioterapi: I forbindelse med ledskred
D.1.5.6. Velfungerende kunstigt		Medicin:	Medicin:	Ja	Ja	Nej

skulderled		Smertestillende, Fysioterapi.	0-6 måneder, Fysioterapi: 0-6 måneder			
D.1.5.7. Ikke velfungerende kunstigt skulderled		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi.	Medicin: 0-6 måneder, Fysioterapi: 0-6 måneder	Ja	Ja	Nej
D.1.5.8. Stivhed i skulder med armen ind til kroppen		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-6 måneder, Fysioterapi: 0-6 måneder	Ja	Ja	Medicin: Smertestillende ved kroniske smerter
D.1.5.9. Forandringer i skulderleddets rotatorsener - til tider belastningsudløste smerter - og normal bevægelighed		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi.	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Nej
D.1.5.10. Forandringer i skulderleddets rotatorsener - med daglige, belastningsudløste smerter og normal bevægelighed		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi.	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Nej
D.1.5.11. Forandringer i skulderleddets rotatorsener - med daglige, belastningsudløste smerter og let nedsat bevægelighed		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-6 måneder, Fysioterapi: 0-6 måneder	Ja	Ja	Nej
D.1.6. Kraveben						
D.1.6.1. Følger efter brud på kraveben - til tider belastningsudløste smerter - og normal bevægelighed		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Nej
D.1.6.2. Følger efter brud på kraveben med daglige, belastningsudløste smerter og let nedsat bevægelighed		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Nej
D.1.6.3. Følger efter brud på		Medicin:	Medicin:	Ja	Ja	Nej

kraveben med daglige, belastningsudløste smerter og middelsvær bevægeindskrænking		Smertestillende, Fysioterapi	0-6 måneder, Fysioterapi: 0-6 måneder			
D.1.7. Skulderhøjdeled						
D.1.7.1. Følger efter læsion af skulderhøjdeled - til tider belastningsudløste smerter - og normal bevægelighed		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Nej
D.1.7.2. Følger efter læsion af skulderhøjdeled med daglige, belastningsudløste smerter og let nedsat bevægelighed		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Nej
D.1.7.3. Følger efter læsion af skulderhøjdeled med daglige, belastningsudløste smerter og middelsvær bevægeindskrænking		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Nej
D.1.8. Arm						
D.1.8.1. Tab af arm	Spørg lægekonsulenten i hvert tilfælde					
D.1.8.2. Amputation på overarm	Spørg lægekonsulenten i hvert tilfælde					
D.1.8.3. Amputation på underarm med god bevægelighed i albue	Spørg lægekonsulenten i hvert tilfælde					
D.1.8.4. Ikke helet ruptur af biceps (ved skulderleddet)						
D.1.8.4.1. Med god kraft		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Nej

D.1.8.4.2. Med nedsat skulder/albuefunktion		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Nej
D.1.8.5. Ikke helet ruptur af biceps (ved albueleddet)						
D.1.8.5.1. Med god kraft		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Nej
D.1.8.5.2. Med nedsat albuefunktion		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Nej
D.1.9. Nervelesioner						
D.1.9.1. Plexus brachialis						
D.1.9.1.1 Total lammelse af plexus brachialis	Spørg lægekonsulenten i hvert tilfælde					
D.1.9.1.2. Partiel lammelse af plexus brachialis	Spørg lægekonsulenten i hvert tilfælde					
D.1.9.1.3. Total trapeziuslammelse	Spørg lægekonsulenten i hvert tilfælde					
D.1.9.2. Nervus radialis (spolebensnerven)						
D.1.9.2.1. Total lammelse af nervus radialis på overarm	Spørg lægekonsulenten i hvert tilfælde					
D.1.9.2.2. Partiel lammelse af	Spørg lægekonsulenten i hvert tilfælde					

nervus radialis						
D.1.9.3. Nervus ulnaris (albuebensnerven)						
D.1.9.3.1. Total lammelse af nervus ulnaris på overarm	Spørg lægekonsulenten i hvert tilfælde					
D.1.9.3.2. Partiel lammelse af nervus ulnaris	Spørg lægekonsulenten i hvert tilfælde					
D.1.9.4. Nervus medianus (midternerven)						
D.1.9.4.1. Total lammelse af nervus medianus på overarm, med både sensoriske og motoriske skader	Spørg lægekonsulenten i hvert tilfælde					
D.1.9.4.2. Partiel lammelse af nervus medianus	Spørg lægekonsulenten i hvert tilfælde					
D.1.9.5. Karpaltunnelsyndrom		Medicin: Smertestillende+ Fysioterapi				
D.1.9.5.1. Med smerter og lette objektive føleforstyrrelser		Medicin: Smertestillende+ Fysioterapi	Medicin: Indtil 2 år, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Nej
D.1.9.5.2. Med smerter, svære føleforstyrrelser og motoriske symptomer		Medicin: Smertestillende+ Fysioterapi	Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Medicin: Smertestillende
D.1.9.5.3. Med smerter, total lammelse, muskelsvind og objektive føleforstyrrelser		Medicin: Smertestillende+ Fysioterapi	Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Medicin: Smertestillende

D.1.9.6. Læsion af fingernerve til pincetgrebet						
D.1.9.6.1. Totalt føletab på den halvdel af tommelfingerens yderstykke, som vender mod pegefingern (pincetgrebet), som følge af læsion af fingernerve		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder	Ja	Ja	Nej
D.1.9.6.2. Totalt føletab på bøjesiden af hele tommelfingerens yderstykke som følge af læsion af begge fingernerver		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder	Ja	Ja	Nej
D.1.9.6.3. Totalt føletab på den halvdel af tommelfingerens yderstykke, som vender mod pegefingern, og samtidigt totalt føletab på den halvdel af pegefingerns yderstykke, der vender mod tommelfingern (pincetgrebet), som følge af læsion af fingernerver		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder	Ja	Ja	Nej
D.1.9.6.4. Totalt føletab på den halvdel af pegefingerns yderstykke, der vender mod tommelfingern (pincetgrebet), som følge af læsion af fingernerve		Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder	Ja	Ja	Nej
D.1.9.7. Funktionstab som følge af kvæstelser	Spørg lægekonsulenten i hvert tilfælde					
D.2. Underkstremiteter (ben)						
D.2.1. Fod						
D.2.1.1.	Sygesikringens	Medicin:	Medicin:	Ja	Ja	Medicin:

Tab af fod med god protesefunktion	regler med Håndsyede sko	Smertestillende	0-3 måneder			Smertestillende varigt ved fantomsmerter
D.2.1.2. Tab af fod med dårlig protesefunktion	Sygesikringens regler med Håndsyede sko	Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder	Ja	Ja	Medicin: Smertestillende varigt ved fantomsmerter
D.2.1.3. Amputation i fodrod med bæredygtig stump	Sygesikringens regler med Håndsyede sko	Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder	Ja	Ja	Medicin: Smertestillende varigt ved fantomsmerter
D.2.1.4. Tab af alle tæer på én fod	Sygesikringens regler med Håndsyede sko	Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder	Ja	Ja	Medicin: Smertestillende varigt ved fantomsmerter
D.2.1.5. Tab af 1. tå og noget af dens mellemfodsben	Sygesikringens regler med Håndsyede sko	Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder	Ja	Ja	Medicin: Smertestillende varigt ved fantomsmerter
D.2.1.6. Tab af 1. tå	Sygesikringens regler med Håndsyede sko	Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder	Ja	Ja	Medicin: Smertestillende varigt ved fantomsmerter
D.2.1.7. Tab af 1. tås yderstykke	Sygesikringens regler med Håndsyede sko	Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder	Ja	Ja	Medicin: Smertestillende varigt ved fantomsmerter
D.2.1.8. 1. tå med stift grundled	Sygesikringens regler med Håndsyede sko, Hjælpemidler, Evt. Gængesål	Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder	Ja	Ja	Medicin: Smertestillende varigt ved fantomsmerter
D.2.1.9.	Sygesikringens	Medicin:	Medicin:	Ja	Ja	Medicin:

1. tå med stift yderled	regler med Håndsyede sko, Hjælpemidler, Evt. Gængesål	Smertestillende	0-3 måneder			Smertestillende Varigt ved fantomsmerter
D.2.1.10. Tab af 2. tå	Sygesikringens regler med Håndsyede sko	Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder	Ja	Ja	Medicin: Smertestillende varigt ved fantomsmerter
D.2.1.11. Tab af en af de andre tæer	Sygesikringens regler med Håndsyede sko	Medicin: Smertestillende	Medicin: 0-3 måneder	Ja	Ja	Medicin: Smertestillende varigt ved fantomsmerter
D.2.2. Fodled						
D.2.2.1. Ledbåndsskade i fodled med smerter og klinisk løshed		Medicin. Smertestillende, Fysioterapi, Vippebræt	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	
D.2.2.2. Brud på fodled helet med lette smerter og let nedsat bevægelighed	Serviceoven: Evt. Håndsyede sko, Gængesål, Kapsel	Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	
D.2.2.3. Brud på fodled helet med middelsvære smerter og middelsvært nedsat bevægelighed, samt eventuel skurren	Serviceoven: Evt. Håndsyede sko, Gængesål, Kapsel	Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Medicin: Smertestillende Varigt, spørg lægekonsulenten
D.2.2.4. Brud på fodled helet med svære smerter og svært nedsat bevægelighed, samt eventuel skurren	Serviceoven: Evt. Håndsyede sko, Gængesål,	Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	

	Kapsel					
D.2.2.5. Fodled stift i ret vinkel eller let spidsfod (10 grader - 15 grader)	Service-loven: Evt. Håndsyede sko, Gængesål, Kapsel	Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	
D.2.2.6. Fodled stift i udtalt spidsfodstilling	Service-loven: Evt. Håndsyede sko, Gængesål, Kapsel	Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	
D.2.3. Akillessene						
D.2.3.1. Følger efter sprængning af akillessene med nedsat bevægelighed i fodled og muskelsvind af læg, samt eventuelt smerter		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	
D.2.4. Hælben						
D.2.4.1. Brud på hælben med lette smerter og let nedsat bevægelighed i bagfoden	Service-loven: Håndsyede sko, Gængesål, Kapsel	Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Service-loven: Håndsyede sko, Gængesål, Kapsel
D.2.4.2. Brud på hælben med svære smerter og udtalt nedsat bevægelighed i bagfoden	Service-loven: Håndsyede sko, Gængesål, Kapsel	Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Service-loven: Håndsyede sko, Gængesål, Kapsel
D.2.4.3. Brud på hælben med deformitet, svære smerter og ophævet bevægelighed i bagfoden	Service-loven: Håndsyede sko, Gængesål, Kapsel	Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Service-loven: Håndsyede sko, Gængesål, Kapsel
D.2.5. Ben						
D.2.5.1. Tab af et ben	Service-loven:	Medicin:	Medicin:	Ja	Ja	Medicin: varigt –

	Håndsyede sko, Gængesål, Kapsel, Specialprotese: Spørg lægekonsulenten	Smertestillende, Fysioterapi	0-6 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder			spørg lægekonsulent. Serviceloven: Håndsyede sko, Gængesål, kapsel, Specialprotese: Spørg lægekonsulenten
D.2.5.2. Amputation i knæet eller på låret med god protesefunktion	Serviceloven: Håndsyede sko, Gængesål, Kapsel, Specialprotese: Spørg lægekonsulenten	Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-6 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Medicin: varigt – spørg lægekonsulent. Serviceloven: Håndsyede sko, Gængesål, Kapsel. Specialprotese: Spørg lægekonsulenten
D.2.5.3. Amputation i knæet eller på låret med dårlig protesefunktion	Serviceloven: Håndsyede sko, Gængesål, Kapsel. Specialprotese: Spørg lægekonsulenten	Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-6 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Medicin: varigt – spørg lægekonsulent. Serviceloven: Håndsyede sko, Gængesål, Kapsel. Specialprotese: Spørg lægekonsulenten
D.2.5.4. Tab af underben med god	Serviceloven:	Medicin:	Medicin:	Ja	Ja	Medicin: varigt –

protesefunktion	Håndsyede sko, Gængesål, Kapsel. Specialprotese: Spørg lægekonsulenten	Smertestillende, Fysioterapi	0-6 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder			spørg lægekonsulent. Serviceloven: Håndsyede sko, Gængesål, Kapsel. Specialprotese: Spørg lægekonsulenten
D.2.5.5. Tab af underben med dårlig protesefunktion	Serviceloven: Håndsyede sko, Gængesål, Kapsel. Specialprotese: Spørg lægekonsulenten	Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-6 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Medicin: varigt – spørg lægekonsulent. Serviceloven: Håndsyede sko, Gængesål, Kapsel. Specialprotese: Spørg lægekonsulenten
D.2.5.6. Forkortning mindre end 3 cm		Fysioterapi: Afhænger af grundsygdommen, Evt. Hælførhøjelse				Evt. Hælførhøjelse
D.2.5.7. Forkortning mindst 3 cm		Fysioterapi: Afhænger af grundsygdommen. Evt. Hælførhøjelse				Evt. Hælførhøjelse

D.2.5.8. Lårsvind mindst 3 cm (adderes ikke til mén for forkortning, løshed, nervelæsioner eller bevægeindskrænking)		Fysioterapi: Afhænger af grund-sygdommen. Evt. Hælførhøjelse				Evt. Hælførhøjelse
D.2.5.9. Postthrombotisk syndrom i et ben		Medicin. Hjælpemiddel: Komp-strømper				Medicin: varigt Hjælpemiddel: Komp-strømper varigt
D.2.5.10. Væsentlig forværrelse af åreknuder eller skinnebessår		Medicin: Smertestillende, Salver, Strømper				Salver, Strømper: Varigt
D.2.6. Underben						
D.2.6.1. Brud på skaftet af skinneben helet uden smerter og uden fejlstilling, fejlrotation eller forkortning						
D.2.6.2. Brud på skaftet af skinneben helet med smerter og let fejlstilling, fejlrotation eller forkortning		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-12 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	
D.2.6.3. Brud på skaftet af skinneben helet med smerter og middelsvær fejlstilling, fejlrotation eller forkortning		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-12 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	
D.2.6.4. Brud på skaftet af skinneben helet med smerter og svær fejlstilling, fejlrotation eller forkortning		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-12 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	
D.2.7. Knæled						
D.2.7.1. Knæ stift i god stilling		Hælførhøjelse afhængig af strækkemanglen				

D.2.7.2. Knæ med indtil 5 graders strækkemangel		Hælførhøjelse afhængig af strækkemanglen				
D.2.7.3. Knæ med bøjeevne nedsat til 90 grader		Hælførhøjelse afhængig af strækkemanglen				
D.2.7.4. Læsion af bruske på bagside af knæskal og/eller andet sted i knæleddet med let skurren ved bevægelser, eventuelt med let muskelsvind og bevægeindskrænking		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-6 måneder, Fysioterapi: 0-6 måneder	Ja	Ja	
D.2.7.5. Læsion af bruske på bagside af knæskal og/eller andet sted i knæleddet med stærk skurren ved bevægelser, med noget muskelsvind og nogen bevægeindskrænking		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-6 måneder, Fysioterapi: 0-6 måneder	Ja	Ja	
D.2.7.6. Læsion af menisk uden smerter og med normal bevægelighed		Medicin, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	
D.2.7.7. Læsion af menisk med lette smerter, let muskelsvind, eventuelt let nedsat bevægelighed og eventuelt indeklemningstilfælde		Medicin, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	
D.2.7.8. Habituel, hyppigt ledscred af knæskal		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Fysioterapi: I forbindelse med ledscred
D.2.7.9. Tab af knæskal		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi.	Medicin, Fysioterapi: 0-6 måneder	Ja	Ja	Medicin: Smertestillende varigt
D.2.7.10. Læsion af korsbånd med generende skuffeløshed og	.	Donjoy: Spørg lægekonsulenten				

beskedne objektive fund		.				
D.2.7.11. Læsion af korsbånd med moderat skuffeløshed og let muskelsvind og/eller let bevægeindskrænkning		Donjoy: Spørg lægekonsulenten +Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-6 måneder, Fysioterapi: 0-6 måneder	Ja	Ja	
D.2.7.12. Læsion af korsbånd med moderat skuffeløshed, moderat muskelsvind og/eller moderat bevægeindskrænkning		Donjoy: Spørg lægekonsulenten Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-6 måneder, Fysioterapi: 0-6 måneder	Ja	Ja	
D.2.7.13. Læsion af korsbånd med svær skuffeløshed, svært muskelsvind og/eller større bevægeindskrænkning		Donjoy: Spørg lægekonsulenten Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-6 måneder, Fysioterapi: 0-6 måneder	Ja	Ja	
D.2.7.14. Læsion af korsbånd med svær skuffeløshed, svært muskelsvind og/eller større bevægeindskrænkning samt svær sideløshed		Donjoy: Spørg lægekonsulenten Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-6 måneder, Fysioterapi: 0-6 måneder	Ja	Ja	
D.2.7.15. Læsion af korsbånd med svær skuffeløshed, svært muskelsvind og/eller større bevægeindskrænkning, svær sideløshed samt behov for konstant og daglig anvendelse af stabiliserende bandage Er der foretaget korsbåndsrekonstruktion, vil vurderingen ske efter ovenstående satser på baggrund af operationsresultatet.		Donjoy, Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-6 måneder, Fysioterapi: 0-6 måneder	Ja	Ja	Donjoy: varigt

D.2.7.16. Isoleret læsion af sideledbånd med generende sideløshed og lette objektive fund		Donjoy, Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-6 måneder, Fysioterapi: 0-6 måneder	Ja	Ja	Donjoy: varigt
D.2.7.17. Isoleret læsion af sideledbånd med svær sideløshed og svære objektive fund		Donjoy, Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-6 måneder, Fysioterapi: 0-6 måneder	Ja	Ja	Donjoy: varigt
D.2.7.18. Velfungerende kunstigt knæled		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-6 måneder, Fysioterapi: 0-6 måneder	Ja	Ja	
D.2.7.19. Ikke velfungerende kunstigt knæled	Spørg lægekonsulenten i hvert tilfælde					
D.2.8. Lårben						
D.2.8.1. Brud på skaftet af lårben helet uden smerter og uden fejlstilling, fejlrotation eller forkortning		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	
D.2.8.2. Brud på skaftet af lårben helet med smerter og let fejlstilling, fejlrotation eller forkortning		Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	
D.2.8.3. Brud på skaftet af lårben helet med smerter og middelsvær fejlstilling, fejlrotation eller forkortning	Evt. Hælførhøjelse: Afhængig af grunden til forkortningen	Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	
D.2.8.4. Brud på skaftet af lårben helet med smerter og svær fejlstilling, fejlrotation eller forkortning	Evt. Hælførhøjelse: Afhængig af grunden til forkortningen	Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	

D.2.9. Hofte						
D.2.9.1. Brud på lårbenshals, helet med smerter og let nedsat bevægelighed	Evt. Hælførhøjelse: Afhængig af grunden til forkortningen	Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Medicin: Varigt, spørg lægekonsulenten.
D.2.9.2. Brud på lårbenshals, helet med smerter og middelsvært nedsat bevægelighed	Evt. Hælførhøjelse: Afhængig af grunden til forkortningen	Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Medicin: Varigt, spørg lægekonsulenten
D.2.9.3. Brud på lårbens, gennem omdrejningsknoerne, helet med smerter og let nedsat bevægelighed	Evt. Hælførhøjelse: Afhængig af grunden til forkortningen	Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Medicin: Varigt, spørg lægekonsulenten
D.2.9.4. Brud på lårbens, gennem omdrejningsknoerne, helet med smerter og middelsvært nedsat bevægelighed	Evt. Hælførhøjelse: Afhængig af grunden til forkortningen	Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Medicin: Varigt, spørg lægekonsulenten
D.2.9.5. Hofte med svær indskrænkning af hoftefunktionen (Girdlestone's status)	Evt. Hælførhøjelse: Afhængig af grunden til Forkortningen samt evt. ganghjælpemiddel	Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Medicin: Varigt, spørg lægekonsulenten
D.2.9.6. Velfungerende kunstigt hofteled	Evt. Hælførhøjelse: Afhængig af grunden til forkortningen	Medicin: Smertestillende, Fysioterapi	Medicin: 0-3 måneder, Fysioterapi: 0-3 måneder	Ja	Ja	Medicin: Varigt, spørg lægekonsulenten

D.2.9.7. Ikke velfungerende kunstigt hoftelid	Spørg lægekonsulenten i hvert tilfælde					
D.2.9.8. Hofte med stift gunstig stilling	Spørg lægekonsulenten i hvert tilfælde					
D.2.10. Nerverlæsioner						
D.2.10.1. Nervus ischiadicus		Fysioterapi, Myo-elektriske hjælpemidler. Smertestillende medicin Spørg Neurologisk- lægekonsu- lent	Fysioterapi: 0-12 måneder			
D.2.10.1.1. Let lammelse		Fysioterapi. Myo-elektriske hjælpemidler: Smertestillende medicin Spørg Neurologisk- lægekonsu- lent	Fysioterapi: 0-12 måneder			
D.2.10.1.2. Moderat eller partiel lammelse		Fysioterapi. Myo-elektriske hjælpemidler: Smertestillende medicin Spørg Neurologisk- lægekonsu- lent + skinne	Fysioterapi: 0-12 måneder			Skinne udskiftes 1 gang pr. år
D.2.10.1.3. Total lammelse		Fysioterapi.	Fysioterapi:			

		Myo-elektriske hjælpemidler: Smertestillende medicin Spørg Neurologisk- lægekonsu- lent + skinne, Fysioterapi, Myo-elektriske hjælpemidler: Spørg Neurologisk- lægekonsu- lent + skinne	0-12 måneder			
D.2.10.2. Nervus femoralis		Fysioterapi, Myo-elektriske hjælpemidler: Smertestillende medicin Spørg Neurologisk- lægekonsu- lent + skinne	Fysioterapi: 0-12 måneder			
D.2.10.2.1. Let lammelse		Fysioterapi, Myo-elektriske hjælpemidler: Smertestillende medicin Spørg Neurologisk- lægekonsu- lent + skinne	Fysioterapi: 0-12 måneder			

D.2.10.2.2. Total lammelse med følelsesløshed		Fysioterapi, Myo-elektriske hjælpemidler: Smertestillende medicin Spørg Neurologisk-lægekonsulent + skinne	Fysioterapi: 0-12 måneder			
D.2.10.3. Nervus tibialis communis		Fysioterapi, Myo-elektriske hjælpemidler: Smertestillende medicin Spørg Neurologisk-lægekonsulent + skinne.	Fysioterapi: 0-12 måneder			
D.2.10.3.1. Let eller partiel lammelse		Fysioterapi, Myo-elektriske hjælpemidler: Smertestillende medicin Spørg Neurologisk-lægekonsulent + skinne.	Fysioterapi: 0-12 måneder			
D.2.10.3.2. Total lammelse med følelsesløshed		Fysioterapi, Myo-elektriske hjælpemidler: Smertestillende medicin Spørg	Fysioterapi: 0-12 måneder			

		Neurologisk-lægekonsulent + skinne.				
D.2.10.4. Nervus peroneus		Fysioterapi, Myo-elektriske hjælpemidler: Smertestillende medicin Spørg Neurologisk-lægekonsulent + skinne.	Fysioterapi: 0-12 måneder			
D.2.10.4.1. Let eller partiel lammelse		Fysioterapi, Myo-elektriske hjælpemidler: Smertestillende medicin Spørg Neurologisk-lægekonsulent + skinne.	Fysioterapi: 0-12 måneder			
D.2.10.4.2. Total lammelse med følelsesløshed		Fysioterapi, Myo-elektriske hjælpemidler: Smertestillende medicin Spørg Neurologisk-lægekonsulent + skinne.	Fysioterapi: 0-12 måneder			
E. Lunge- og hjertekarsygdomme og perifere karskader						

E.1. Astma						
E.1.1. Sikker astma, men ingen symptomer, når pågældende stof undgås og det er let at undgå		Intet				
E.1.2. Sjældne anfald, men afhængig af medicin		Medicin: Beta2 agonister (korttids- eller langtidsvirkende) glucokortikoider (inhaleret eller peroralt), Leukotrien antagonist. Evt. middel mod svamp i munden		Ja	Ja	Medicin: Beta2 agonister (korttids- eller langtidsvirkende) Glucokortikoider (inhaleret eller peroralt), Leukotrien antagonist.
E.1.3. Hyppige anfald og afhængig af medicin (herunder anfald udløst ved anstrengelse, løb med videre)		Medicin: Beta2 agonister (korttids- eller langtidsvirkende) glucokortikoider (inhaleret eller peroralt), Leukotrien antagonist I sjældne tilfælde allergene ekstrakter til vaccination, men lægekonsulenten bør i så fald inddrages		Ja	Ja	Medicin: Beta2 agonister (korttids- eller langtidsvirkende) glucokortikoider (inhaleret eller peroralt), Leukotrien antagonist I sjældne tilfælde allergene ekstrakter til vaccination, men lægekonsulenten bør i så fald inddrages

E.2. Begrænsning i funktionskapacitet ved lunge- og hjertekarsygdomme	Nedennævnte kun ved lunge – ved hjerte: spørg lægekonsulent en.					
E.2.1. Ingen begrænsning af den fysiske aktivitet		Intet				
E.2.2. Let begrænsning af den fysiske aktivitet, symptomerne fremkommer kun ved kraftig aktivitet		Medicin: Beta2-agonister (korttids- eller langtidsvirkende) antikolinergika (korttids- eller langtidsvirkende) glukokortikoider (inhaleret eller peroralt). Antibiotika, midler mod svamp i munden, slimløsende midler eller lungefysioterapi kan komme på tale.		Ja	Ja	Medicin: Beta2-agonister (korttids- eller langtidsvirkende) antikolinergika (korttids- eller langtidsvirkende) glukokortikoider (inhaleret eller peroralt). Antibiotika, midler mod svamp i munden, slimløsende midler eller lungefysioterapi kan komme på tale.
E.2.3. Betydelig begrænsning af den fysiske aktivitet, symptomerne fremkommer også ved lettere aktivitet		Medicin: Beta2-agonister (korttids- eller langtidsvirkende) antikolinergika (korttids- eller		Ja	Ja	Medicin: Beta2-agonister (korttids- eller langtidsvirkende) , antikolinergika (korttids- eller

		langtidsvirkende) glukokortikoider (inhaleret eller peroralt). Antibiotika, midler mod svamp i munden, slimløsende midler eller lungefysioterapi kan komme på tale.				langtidsvirkende) glukokortikoider (inhaleret eller peroralt). Antibiotika, midler mod svamp i munden, slimløsende midler eller lungefysioterapi kan komme på tale.
E.2.4. Enhver fysisk aktivitet udløser symptomer, og symptomerne kan være til stede i hvile		Medicin: Beta2-agonister (korttids- eller langtidsvirkende) antikolinergika (korttids- eller langtidsvirkende) glukokortikoider (inhaleret eller peroralt). Antibiotika, midler mod svamp i munden, slimløsende midler eller lungefysioterapi kan komme på tale.		Ja	Ja	Medicin: Beta2-agonister (korttids- eller langtidsvirkende) , antikolinergika (korttids- eller langtidsvirkende) , glukokortikoider (inhaleret eller peroralt). Antibiotika, midler mod svamp i munden, slimløsende midler eller lungefysioterapi kan komme på tale.
E.3. Følger efter perifere karskader	Spørg lægekonsulenten i hvert tilfælde					
F. Indre organer	Spørg lægekonsulenten i hvert tilfælde					

F.1. Bughule/bugvæg	Spørg lægekonsulenten i hvert tilfælde					
F.2. Tarme/afføringsforstyrrelser	Spørg lægekonsulenten i hvert tilfælde					
F.3. Nyrer/urinveje	Spørg lægekonsulenten i hvert tilfælde					
F.4. Kønsgorganer	Spørg lægekonsulenten i hvert tilfælde					
G. Hudsygdomme	Se specielt afsnit om hud sygdomme					
H. Vansir	Spørg lægekonsulenten i hvert tilfælde					
I. Kræftsygdomme Kræftsygdomme har så forskellige følger, at det ikke er muligt at udarbejde en egentlig tabel. Følgende tjener imidlertid som udgangspunkt ved vurderingen.	Kræftformerne: Lungekræft, næsekræft, blærekræft					
I.1. Kræftsygdom, radikalt opereret/behandlet med skønnet ringe risiko for tilbagefald		Medicin: Smertestillende		Ja	Ja	Ja
I.2. Kræftsygdom, radikalt opereret/behandlet, men med stor eller meget stor risiko for tilbagefald		Se E.1.3		Ja	ja	Ja
I.3. Inoperabel (lunge)kræft – som udgangspunkt		Se E.1.3		Ja	ja	Ja
J. Psykiske skader	Se specielt afsnit om psykiske sygdomme					